

La méthode de John Ransford



LA MÉTHODE DE JOHN RANSFORD POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT D'UNE POPULATION SAUVAGE DE FAISANS COMMUNS.

Dans les années 80, John Ransford, gestionnaire avisé des territoires célèbres de chasse de Powis Castle, Wymore et Lymore (situés à la limite de l'Angleterre et du pays de Galles) donnait aux personnes soucieuses de constituer une population sauvage de faisans les conseils suivants :

Lorsqu'une population sauvage commence à s'établir sur un territoire bien aménagé et piégé, il est tentant d'essayer de la protéger tout en continuant de chasser raisonnablement. Cela est possible et beaucoup plus facile à faire accepter aux chasseurs que de leur imposer l'habituel arrêt total de la chasse pendant 3 à 5 ans !

Il faut alors n'introduire dans la volière anglaise que des coqs.

Durant la saison, les poules ne seront pas tirées tandis que les coqs seront chassés normalement en respectant toutefois la règle d'un prélèvement maximal de 40 % des oiseaux lâchés.

Ainsi, les poules sauvages seront intégralement protégées sans qu'il soit besoin d'augmenter artificiellement leur nombre au printemps suivant ; on sait en effet que plus le nombre de poules présentes au printemps est élevé, plus le taux de reproduction est faible.

On peut parfois arriver de cette manière à constituer une authentique population sauvage qui, dans les meilleurs cas, peut devenir suffisante pour ne plus chasser que des oiseaux naturels.