



DE L'IMPORTANCE DE BAGUER LES OISEAUX DE REPEULEMENT.

Le baguage des oiseaux de repeuplement est essentiel pour connaître l'évolution d'une population de faisans ou perdrix en particulier quand existe une population sauvage résiduelle.

Matériels et méthodes :

- Le baguage s'effectue à l'aide d'une pince permettant de fixer sur l'aponévrose du bord antérieur de l'aile une barrette métallique discrète. Cette opération est indolore.
- La barrette porte nécessairement l'année du lâcher et éventuellement d'autres indications, lieu de lâcher notamment.
- Les oiseaux sont bagués lors de leur mise en place en volière, qu'il s'agisse de faisans ou de perdrix.

Résultats :

Les renseignements fournis par le recueil des bagues lors des prélèvements à la chasse sont nombreux :

- Nombre d'oiseaux de repeuplement tués à la chasse.
- Capacité d'accueil des différentes parties du territoire en fonction de l'endroit où les oiseaux sont prélevés ; pour affiner la méthode, il est utile à la fin de chaque battue de prélever les barrettes et de les mettre dans une boîte identifiant la battue.
- Dispersion des oiseaux : il est important d'essayer d'obtenir des territoires voisins le nombre d'oiseaux bagués prélevés sur ces territoires et d'avoir ainsi une estimation sur les lignes de fuite des oiseaux.

Discussion : Lorsque des oiseaux sont lâchés sur un territoire comportant une population sauvage résiduelle, il est important de connaître le pourcentage des oiseaux de repeuplement prélevé à la chasse, le pourcentage des oiseaux sauvages prélevés étant sensiblement identique. Par exemple, si 100 oiseaux de repeuplement ont été lâchés, que 30 ont été prélevés et que sur ces 30 oiseaux 25 étaient bagués, il est possible de conclure que les cinq oiseaux non bagués prélevés représentent le quart de la population sauvage présente sur le territoire ; la population sauvage présente sur le territoire et donc de $5 \times 4 = 20$ oiseaux sauvages environ.